

MASTERsil®**CZ / OXI TABLET 20 g**

Charakteristika: MASTERsil® OXI – Tablet, jsou tablety na bázi aktivního kyslíku. Jsou určeny pro průběžné ošetření bazénové vody. Postupně se rozpuští bez západu. Lze je používat nezávisle na tvrdosti vody, působi mimoře kyslo a tím lehce sníží hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje likvidaci běžně se vyskytujících bakterii a řas. **Návod k použití:** Díky nepřitomnosti západu jsou vhodné nejen pro úpravu vody v bazénech, ale především také ve vířivkách a SPA. Vzhledem k rychlému úbytku prebytočného kyslíku je možné se kupat velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto přípravkem. Používejte společně s MASTERsil® OXI Šok granulát, MASTERsil® Kríštál, MASTERsil® Algicid, MASTERsil® pH+ a pH– pro kompletní úpravu bazénové vody. **Dávkování:** Tabletu vložte do plaváku nebo do skimmeru, jedna tabletka vydrží orientačně 3-6 dnů (dle teploty a zatížení – čistoty vody). Jedna tabletka 20g je vhodná pro ošetření cca 1m³ vody, 200g tabletka pro cca 10m³ vody. Hodnotu kyslíku měřte testem a udržujte ji v rozmezí 7,0 – 7,4. Při vyšším zatížení bazénu (výšší teploty, počet koupacích se, znečištění, ...) doporučujeme spojit s dávkováním MASTERsil® Algicid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadarselny 100%, (CAS: 70693-62-8). **Standardní věty o nebezpečnosti:** H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poletání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P273 Zabráňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné bryle/blokující žíť. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Všecky kontaminované části odívajte okamžitě svěrákem. Opláchněte kůži vodou/oprskajte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **První pomoc:** Při nadýchaní: Postiženého přenechte na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Při styku s kůží: Svěrákem kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži oplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyměňte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Nevyvolaďte zvracení. Neopadávejte uhličitan/hydrogenuhličitan (sodu/jedlu/sodu). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ve zdravotnickém zařízení. **Skladování:** Skladujte v uzavřených, originálních obalech, v suchu a chladu, v dobré větrných místech, odděleně od potravin a krmiv, mimo zdroje tepla, ohně a hořlavých látek. **Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozspřání tablety smetě, zabrežte prášnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. **Upozornění:** Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. **Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby při uchovávání v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. **Datum výroby / expirace:** Uvedeno na obalu výrobku. **Používejte biocidní přípravky bezpečně.** Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je určen pro neprofesionální použití.

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO:**MASTERsil®****OXI Tablet
20 g**

Pro průběžnou úpravu vody v bazénech
ŽÁDNÝ CHLOR – POUZE AKTIVNÍ KYSLÍK

500 g**SK / OXI TABLET 20 g**

Charakteristika: MASTERsil® OXI – Tablet, sú tablety na báze aktivného kyslíka. Sú určené pre priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Po stupni sa rozpúšťa bez západu. Možno ich používať nezávisle na tvrdosti vody, pôsobiť mimoře kyslo a tým fakto znížiť hodnotu pH vody. Přítomnosť kyslíka zaručuje likvidáciu bežne sa vyskytujúcich bakterií a rias. **Použitie:** Vďaka nepřitomnosti západu sú vhodné nie len pre úpravu vody v bazénoch, ale predovšetkým tiež vo vířivkach a SPA. Vzhľadom k rychlému úbytku prebytočného kyslíku je možné sa kúpať ve skorou po ošetrovaní bazénovej vody týmto prípravkom. Používať spoločne s MASTERsil® OXI Šok granulát, MASTERsil® Kríštáf, MASTERsil® Algicid, MASTERsil® pH+ a pH– pre kompletnú úpravu bazénovej vody. **Dávkovanie:** Tabletu vložte do plaváku alebo do skimmeru, jedna tabletka vydrží orientačne 3 - 6 dní (podľa teploty a zataženia - čistoty vody). Jedna tabletka 20g je vhodná pre ošetrovanie cca 1m³ vody, 200g tabletka pre cca 10m³ vody. Hodnotu kyslíka merajte testerom a udržujte ju v rozmedzí 5 - 10 mg/l, pH hodnoty v rozmedzí 7,0 - 7,4. Pri vyššom zatažení bazéna (výššie teploty, počet kúpacích sa, znečistenie, ...) odporúčame spojiť s dávkovaním MASTERsil® Algicid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadarselny 100%, (CAS: 70693-62-8). **Využívané upozornenia:** H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje väzne poletanie kože a poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhouhodobými účinkami. **Bezpečnostné upozornenie:** P273 Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. P280 Používať ochranné rukavice/ochranný oděv/tvarový štit. P301+P361+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnieť ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracenie. P303+P361+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odívajte okamžitě svěrákem. **Prvá pomoc:** Při nadýchaní: Postiženého přenechte na čerstvý vzduch. Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): všecky kontaminované časti odívajte okamžitě svěrákem. **Upozornenie:** P273 Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. P280 Používať ochranné rukavice/ochranný oděv/tvarový štit. P301+P361+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnieť ústa. Nevyvolávať zvracenie. P303+P361+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odívajte okamžitě svěrákem. **Prvá pomoc:** Při nadýchaní: Postiženého přenechte na čerstvý vzduch. Při problémoch vyhlaďujte lekárské ošetření. Při styku s kůží: Svěrákem kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži omývajte velkým množstvem vody apon 15 minut. Při zasažení očí: Ak má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyměňte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lekárské ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Neopadávejte uhličitan/hydrogenuhličitan (sodu/jedlu/sodu). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ve zdravotnickém zařízení. **Skladovanie:** Skladujte v uzavřených, originálnych obalech, v suchu a chlade, v dobré větrných miestach, oddelenie od potravín a krmív, mimo zdroje tepla, ohňa a horlavých látok. **Údaje pre dekontamináciu:** V prípade rozspriania tablety smetie, zabrežte prásnosti, prípadne dokladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. **Upozornenie:** Dodavateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakládaním s prípravkom. **Záručná doba:** 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovávaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. **Datum výroby/expracie:** Uvedené na obale výrobku. **Používať je určený pre neprofesionálne použitie.**

Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk

tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230

email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava

tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500

email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk



Made in Europe